




Biosicherheitsprogramm




Personalhygiene




Handhygiene

Produkt	Indikation	Konzentration	Frequenz
<p>Kenoderm</p> <p>Handseife mit Desinfektionsmittel <i>Wirkstoff: Chlorhexidin</i></p>  <p>BAUA: N-18081</p>	<p>Reinigung und Desinfektion der Hände</p>	<p>Gebrauchsfertig, 3 ml anwenden</p>	<p>Vor Betreten des Stalls, nach Verlassen des Stalls, und nach Bedarf</p> 
<p>Kenosept L / Kenosept G</p> <p>Desinfektionsmittel für die Hände <i>Wirkstoffe: Isopropanol, Chlorhexidin</i></p>  <p>BAUA: N-18081</p>	<p>Desinfektion der Hände</p>	<p>Gebrauchsfertig, 3 ml anwenden</p>	<p>Nach dem Händewaschen vor Betreten des Stalls, nach Verlassen des Stalls, und nach Bedarf</p>

Stiefeldesinfektion

Produkt	Indikation	Konzentration	Aufbringung	Frequenz
<p>Virocid</p> <p>Desinfektionsmittel <i>Wirkstoffe: QAV, Glutaraldehyd, Isopropanol</i></p>  <p>BAUA: N-37328</p>	<p>Eliminierung von Bakterien, Pilzen, Viren, Sporen</p>	<p>0,5 - 1 %</p> <p>Lösung alle 3 Tage auswechseln</p>	<p>Wanne, Matte, Schleuse</p>	<p>Vor Betreten des Stalls, nach Verlassen des Stalls, und nach Bedarf</p> 
<p>Kickstart</p> <p>Desinfektionsmittel <i>Wirkstoffe: Essigsäure, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid</i></p>  <p>BAUA: N-65879</p>	<p>Eliminierung von Bakterien, Pilzen, Viren, Sporen</p>	<p>1-2 %</p> <p>Lösung täglich auswechseln</p>	<p>Wanne, Matte, Schleuse</p>	<p>Vor Betreten des Stalls, nach Verlassen des Stalls, und nach Bedarf</p>

<p>Virocid RTU</p> <p>Desinfektionsmittel QAV, <i>Glutaraldehyd, Isopropanol</i></p>  <p>BAUA: N-47090</p>	<p>Eliminierung von Bakterien, Pilzen, Viren, Sporen</p>	<p>Gebrauchsfertig</p>		<p>Bei Bedarf auf zuvor gereinigte Arbeitsgeräte sprühen (Stiefel, Schaufel ...)</p>
--	--	------------------------	--	--

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.